

服用される前に必ずこの文書をお読み下さい。また、薬とともに大切に保存してください。



鎮咳薬 コーブパウダー

【この薬の特徴】 本剤は長年の経験を基として創製された咳止め薬です。西洋薬と生薬を配合した良薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。（眠気等があらわれることがある。）
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
- 過量服用・長期連用しないこと。
- 12才未満の小児



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| | |
|------------------------------|---|
| (1) 医師の治療を受けている人 | (5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 | (6) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 |
| (3) 高齢者 | |
| (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 | |
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 皮膚 | 消化器 | 精神神経系 | 泌尿器 |
|------|-----------|-------------|-------|------|
| 症状 | 発疹・発赤、かゆみ | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | めまい | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能】 たん(痰)、せき(咳)

【用法・用量】 下記の量を1日3回、食後に水又はお湯と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おくこと。

| 年齢 | 1回量 |
|-----------|------|
| 大人(15歳以上) | 1包 |
| 12歳～14歳 | 2/3包 |

【用法についての注意】

小児(12歳～14歳)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分と働き】 1日量 (3包 3.0g)中

| 成分 | 分量 | 成分の働き |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 30mg | 咳の中枢に作用して、咳を鎮めます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | 気管支を拡張して、咳を鎮めます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg | 抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を抑えます。 |
| キキョウ末 | 400mg | 気道粘膜の分泌を高めて、たんを切りやすくします。 |
| 車前草乾燥エキス | 110mg (車前草として1100mg) | 気道粘膜の分泌を高めて、たんを出しやすくします。 |
| 石蒜エキス-A | 30mg (セキサンとして240mg) | たんを出しやすくします。 |

*添加物として乳糖水和物、パレイシヨデンプンを含有する。
*生薬3剤・・・たんを出しやすくして咳を鎮める薬で古くから使われています。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因となったり品質が変わることがある。)
- 1包を分割して使用する場合は口を折り返して保管し開封後3日を過ぎたものは服用しないで下さい。
- 生薬が配合されていますので湿気に注意して保管して下さい。

【お客様相談窓口】平坂製薬株式会社

☎ 0120-123-728(土、日、祝日を除く9時から17時まで)

製造販売元 平坂製薬株式会社

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 1439-52 〒851-2107
ホームページ <http://www.hirasaka.co.jp/>

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

平坂製薬
モバイルサイト
QRコードを
読み取ってアクセス

