

服用される前に必ずこの文書をお読みください。また、薬とともに大切に保存してください。



# 平坂の鼻炎薬D

## 【この薬の特徴】

眠気の少ないd-クロルフェニラミンマレイン酸塩を配合し、花粉、ハウスダストなどアレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりにすぐれた効果を発揮する鼻炎薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

- 次の人は服用しないこと。
  - 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状がある人：前立腺肥大による排尿困難
  - 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。（眠気があらわれることがある。）
- 長期連用しないこと。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

|                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) 医師の治療を受けている人             | (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人         | (7) 次の症状のある人：高熱、排尿困難                                 |
| (3) 授乳中の人                    | (8) 次の診断を受けた人：緑内障、腎臓病                                |
| (4) 高齢者                      | (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人                |
| (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 |  |
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 皮膚        | 消化器         | 精神神経系            | 泌尿器  |
|------|-----------|-------------|------------------|------|
| 症状   | 発疹・発赤、かゆみ | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | めまい、不眠、神経過敏、けいれん | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症状  |
|--------------------|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。           |
| 再生不良性貧血            | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。     |
| 無顆粒球症              | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。   |
| 急性汎発性発疹性膿疱症        | 高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |

裏面へ続きます

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、眠気
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 【用法・用量】

下記の量を1日3回、食後に水又はぬるま湯と一緒に服用すること。  
服用間隔は4時間以上おくこと。

| 年齢        | 1回量  |
|-----------|------|
| 大人（15歳以上） | 1包   |
| 11歳～14歳   | 2/3包 |
| 7歳～10歳    | 1/2包 |
| 3歳～6歳     | 1/3包 |

## 【用法についての注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 3歳未満の乳幼児には服用させないこと。

## 【成分と働き】 1日量（3包 2.4g）中

| 成分                | 分量    | 成分の働き                             |
|-------------------|-------|-----------------------------------|
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg   | 抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を抑えます。 |
| 塩酸プソイドエフェドリン      | 180mg | 鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻水、鼻づまりを改善します。       |
| 無水カフェイン           | 150mg | 鼻炎に伴う頭重、不快感を和らげます。                |

添加物として乳糖水和物、バレイシヨゲンブンを含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因となったり品質が変わることがある。）
- 1包を分割して使用する場合は、口を折り返して保管し開封後3日を過ぎたものは服用しないで下さい。
- 使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

## 【お客様相談窓口】 平坂製薬株式会社

☎ 0120-123-728（土、日、祝日を除く9時から17時まで）

## 製造販売元 平坂製薬株式会社

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439-52 〒851-2107

ホームページ <http://www.hirasaka.co.jp/>

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

平坂製薬  
モバイルサイト  
QRコードを  
読み取ってアクセス

